

	PDK-Analgesie bei TPE	Freigabe am: 12.05.2020 AA Erfurt-000716
	KANS/ ÄD, PainN, PD	Rev. Nr.: 002 Seite 1 von 1

Perioperativ

- tief-thorakale PDK-Anlage (Th 8/9 oder 9/10)
- Testdosis PDK: **5** ml Ropivacain 0,5%
- Aufspritzen: **5** ml Sufentanil = 25 µg
- kontinuierliche Gabe via PDK ab Hautschnitt mit Ropivacain 0,2%
(Pumpe/Beutel; Laufrate perioperativ bedarfsadaptiert, Zieldosis zur Ausleitung: ≤ **5**ml/h)
- Wund-/Bauchdeckeninfiltration durch den Operateur mit 20 ml Ropivacain 0,25%

Postoperativ

- OP -Tag abends: 1 g Metamizol p.o.
- 1. postoperativer Tag:
 - 4 x 1 g Metamizol p.o.
 - und 2x 10 mg Oxycodon p.o.
 - Auslassversuch PDK

	letzte Bearbeitung:	Prüfung:	Freigabe:	letzte Gültigkeitsprüfung:
Name:	Maiwald, Oliver	Maiwald, Oliver	Liebl-Biereige, Simone	12.05.2020
Datum:	10.03.2020	10.03.2020	12.05.2020	